

VitaFer Macro  
1 x 2-3 l/ha

VitaFer Micro  
1 x 0,5-1 l/ha

VitaFer Micro  
1 x 0,5-1 l/ha

VitaFer Micro  
1 x 0,5-1 l/ha

VitaFer Micro  
1 x 0,5-1 l/ha

+

VitaFer EXTRA Ca  
1 x 3-5l/ha

+

VitaFer EXTRA Ca  
1 x 3-5l/ha

+

VitaFer EXTRA Ca  
1 x 3-5l/ha

Zaleca się stosowanie VitaFer Green 2-3 l/ha oraz VitaFer Algi 2-3 l/ha w krytycznych sytuacjach (po wystąpieniu warunków stresowych, np. przymrozki, susza, opady gradu, nadmierna wilgotność gleby, itd.) w celu ratowania upraw (w każdej fazie rozwoju).

21 dni po  
sadzeniu

Rozwój rozety

Formowanie  
główki

10–14 dni po  
uformowaniu  
główki

20–28 dni po  
uformowaniu  
główki





## Program nawożenia warzyw kapustnych (głowiaste)

Nr zabiegu	Faza rozwoju	Produkt	Liczba zabiegów	Dawka l/ha
1	21 dni po przesadzeniu	VitaFer Macro	1	2-3
2	Rozwój rozety	VitaFer Micro	1	0,5-1
3	Formowanie główki	VitaFer Micro	1	0,5-1
		VitaFer EXTRA Ca	1	3-5
4	10–14 dni po uformowaniu główki	VitaFer Micro	1	0,5-1
		VitaFer EXTRA Ca	1	3-5
5	20–28 dni po uformowaniu główki	VitaFer Micro	1	0,5-1
		VitaFer EXTRA Ca	1	3-5

Zaleca się stosowanie VitaFer Green 2-3 l/ha oraz VitaFer Algi 2-3 l/ha w krytycznych sytuacjach (po wystąpieniu warunków stresowych, np. przymrozki, susza, opady gradu, nadmierna wilgotność gleby, itd.) w celu ratowania upraw (w każdej fazie rozwoju).