

# VitaFer<sup>®</sup> B

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru

150 g/l boru w postaci boroetanoloaminy

VitaFer<sup>®</sup> B to nawóz bogaty w bor. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie objawienia się deficytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

Na niedobory boru narażone są w szczególności buraki cukrowe, rzepak, uprawy sadownicze, warzywa kapustne. Istotne jest, aby zadbać o optymalny poziom tego składnika dla rośliny, ponieważ jego deficyt skutkuje wieloma chorobami, które mogą prowadzić nawet do utraty plonów.

VitaFer<sup>®</sup> B jest bogaty w łatwo przyswajalny bor, który absorbowany jest przez rośliny w bezpieczny sposób.

## Charakterystyka działania

- Skutecznie chroni przed wieloma chorobami buraki cukrowe, rzepak, uprawy sadownicze oraz warzywa kapustne,
- Zapewnia optymalne zaopatrzenie w niezbędny do prawidłowego rozwoju bor, który wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
- Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz wspomaga proces regeneracji roślin,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby,
- Podnosi odporność rośliny na stresy fizjologiczne, szkodniki i inne patogeny.

## Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Burak cukrowy	3	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Kukurydza	2	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Marchew, seler	3	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Owoce pestkowe	3	1	w fazie zielonego pąka (BBCH 50-53); od fazy opadania płatków (BBCH 60-69); po zbiorach (BBCH 91-99)
Owoce ziarnkowe	3	2	w fazie zielonego pąka (BBCH 50-53); od fazy opadania płatków (BBCH 60-69); po zbiorach (BBCH 91-99)
Rzepak	3	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Truskawki	1	2	bezpośrednio przed kwitnieniem i przed wysadzeniem lub zaraz po wysadzeniu (BBCH 47-49)
Tytoń	2	1	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Warzywa kapustne	3	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)
Ziemniaki	2	1-1,5	podczas intensywnego wzrostu w 12-14 dniowych odstępach czasu (BBCH 20-57)

Uwaga: Nawóz może być stosowany tylko w momencie wystąpienia niedoboru boru w zalecanych dawkach.

