

VitaFer[®]

EXTRA Ca

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania wapnia, azotu i magnezu

14% N + 2,80% MgO + 21% CaO
+ mikroelementy

VitaFer[®] EXTRA Ca jest nawozem o wysokim stężeniu wapnia z dodatkiem magnezu, azotu i mikroelementów. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także do bezpiecznego i szybkiego uzupełniania niedoborów w momencie objawienia się deficytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer[®] EXTRA Ca polecany jest dla upraw sadowniczych i warzywniczych. Podnosi ich odporność na warunki stresowe oraz patogeny, zapewnia prawidłowy rozwój i polepsza ich zdolności przechowalnicze, co przekłada się na zdrowe plony o wysokiej wartości handlowej.

Charakterystyka działania

- Skutecznie chroni przed wieloma chorobami, które spowodowane są deficytem wapnia u roślin, który jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ich odporności,
- Zapewnia roślinom optymalne zaopatrzenie w niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki, co wpływa na wzrost wartości handlowej plonów (większe plony, lepszy smak, ładniejszy kolor, większa jędrność), dodatkowo poprawia ich właściwości przechowalnicze,
- Zastosowany w momencie zauważenia choroby wpływa na minimalizację strat w plonach oraz wspomaga proces regeneracji roślin,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.
- Zaopatruje rośliny w wapń i inne ważne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie ich przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Brzoskwinie	3-4	3 – 6	w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
Drzewa pestkowe	3-4	3 – 6	w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
Drzewa ziarnkowe	2-4	2 – 5	w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89)
Inne warzywa w uprawach polowych	2-3	4 – 5	podczas całej wegetacji
Pomidory, papryka, ogórki	2-3	4 – 5 (0,2 % pod osłonami)	od zawiązywania owoców (BBCH 41-51)
Salata, cykoria	2-3	4 – 5	14-21 dni po wysadzeniu (BBCH 15-17)
Truskawki	2-3	3 – 6 (max 3,1 % roztwór)	od zawiązywania owoców (BBCH 67-89)
Warzywa kapustne	2-3	4 – 5	od początku zawiązywania główek (BBCH 19-41)

Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami fosforanowymi.

