



# VitaFer<sup>®</sup> N

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu, fosforu i potasu

14,16% N + 4,72% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
+ 7,08% K<sub>2</sub>O + mikroelementy

**VitaFer<sup>®</sup> N** to nawóz z zawartością kluczowych dla roślin składników pokarmowych: azotu, fosforu, potasu oraz mikroelementów. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania, ale także interwencyjnie, w momencie objawienia się deficytu. Dodatkowo wzbogacony jest o wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

**VitaFer<sup>®</sup> N** przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

## Charakterystyka działania

- Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi makro- i kluczowych mikroelementów,
- Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin,
- Zaopatruje rośliny w azot i inne potrzebne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie ich przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne,
- Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
- Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę,
- Podnosi tolerancję roślin na stropy fizjologiczne,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

## Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Buraki cukrowe	3	5	Faza 3-4 liści (BBCH 13-14) i dwa zabiegi w dwutygodniowym odstępie czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39)
Drzewa i krzewy owocowe	2	5	Faza rozwoju liści (BBCH 15-19) oraz w okresie intensywnego wzrostu
Kukurydza	1-2	5	Faza 4 liści (BBCH 14) i dwa tygodnie po pierwszym zabiegu
Rzepak	3	5	Jeden zabieg jesienią: w fazie 3 liści (BBCH 13), dwa zabiegi wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50-59)
Rośliny ozdobne	1	0,2-0,3%	Zastosować dolistnie oraz do podłoża podczas produkcji rozsady
Truskawki	4	5	3 zabiegi od początku wegetacji do zbiorów oraz jeden po zbiorach
Warzywa gruntowe	2-3	5	Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, w odstępach 8 – 10 dni
Warzywa pod osłonami	2-3	0,2-0,3%	Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, w odstępach 8 – 10 dni
Zboża	3-4	5	Jeden zabieg jesienią: od fazy 3. liścia (BBCH 13); 2-3 zabiegi wiosną: po ruszeniu wegetacji do końca fazy kłoszenia, w odstępach 10-14 dni
Ziemniaki	3	5	2 – 3 tygodnie po początku kiełkowania, w odstępach 10 – 14 dni