

VitaFer[®] PowerPhos

Specjalistyczny nawóz
potasowo-azotowy o silnych
właściwościach grzybobójczych

4% N + 24,30% K₂O
+ 33,70% P₂O₅ (w formie PO₃)

VitaFer[®] PowerPhos jest specjalistycznym nawozem potasowo-azotowym o silnych właściwościach grzybobójczych. Zmniejsza ryzyko immunizacji, czyli uodpornienia się grzybów na fungicydy.

Jest przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla naturalnej flory mikroorganizmów. Nie generuje toksycznych pozostałości w produktach roślinnych, nawet po wielokrotnym wykorzystaniu w sezonie, przez co nie wymaga okresu karencji.

Zaleca się stosowanie nawozu zapobiegawczo i interwencyjnie w momencie wystąpienia infekcji grzybiczej, w celu minimalizacji strat w plonach.

Nawóz może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz poprzez systemy nawadniające.

Charakterystyka działania

- Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin, ale także dzięki swoim właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania,
- Poprawia absorpcję azotu i potasu, które są kluczowymi składnikami dla roślin,
- Zapewnia optymalny rozwój systemu korzeniowego rośliny, zwiększając absorpcję składników odżywczych z gleby,
- Wpływa na wzrost odporności roślin na niekorzystne czynniki, takie jak stresy fizjologiczne, choroby, szkodniki i inne patogeny,
- Przyspiesza regenerację uszkodzeń, które zostały spowodowane przymrozkami, chorobami i atakami patogenów,
- Poprawia wielkość owoców oraz wzrost ilości i jakości plonów.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Drzewa owocowe	3-4	1,5	po opadnięciu płatków (BBCH 71), powtarzać kilka razy co 4 tygodnie
Truskawki	6-7	0,25%*	Sadzonki: zanurzyć korzenie i środek liści na 15-20min,
		6-7	Jesień: rozpylić po zbiorze - koniec września,
		1,5	Dolistnie: 3-4 zabiegi, przed kwitnieniem (BBCH 51-57), powtarzać 2-3 razy aż owoce zaczną nabierać kolorów
		5-6	Fertygacja: 1 zabieg do momentu nabierania kolorów (BBCH 75-79)
Warzywa	3-4	1,5-2,0	po wykształceniu 3-4 liści (BBCH 13-14), co 10-12 dni
Winorośl	2-3	1,5	przed kwitnieniem (BBCH 53), aż do ukształtowania pełnych gron (BBCH 79), w odstępach 12-14 dni
Ziemniaki	3-4	1,5-2,0	stosować od młodych bulw do chwili, gdy łodygi będą suche (BBCH 41-97), co 10-14 dni,

*roztwór wodny

