

VitaFer

Zn+B

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania cynku i boru

5,48% N + 5,48% B + 5,48% Zn

VitaFer Zn+B to nawóz dolistny zaspokajający szczególne potrzeby roślin wrażliwych na niedobór cynku i boru. Do tej grupy w szczególności zalicza się: rzepak i inne rośliny z rodziny kapustowatych, buraki cukrowe i uprawy sadownicze. Zaleca się także stosować w uprawie kukurydzy, zbóż oraz ziemniaków w celu szybkiego i skutecznego uzupełnienia niedoborów tych dwóch mikrośladników, kluczowych dla prawidłowego rozwoju tych upraw.

Problemy z pobieraniem z gleby w wystarczających ilościach boru i cynku występują najczęściej w następujących sytuacjach:

- niska temperatura gleby
- wymywanie w wyniku intensywnych opadów, szczególnie na glebach lekkich
- mała lub zbyt duża zawartość materii organicznej w glebie
- zbyt wysokie pH gleby
- zbyt duża zawartość fosforu w glebie
- niedostateczny rozwój systemu korzeniowego roślin

Charakterystyka działania

- Odpowiednie zaopatrzenie roślin w cynk i bor
- Poprawa wchłaniania mikroelementów, w szczególności boru dzięki zastosowaniu azotu
- Gwarancja wysokiej przyswajalności substancji odżywczych

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Zboża ozime	1	2 – 3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg na początku krzewienia, szczególnie na intensywnie prowadzonych plantacjach pszenicy i jęczmienia, wiosną 1 – 2 zabiegi od ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego
Zboża jare	1	2 zabiegi: od fazy 3 liści do fazy liścia flagowego
Rzepak	2	3 zabiegi: jesienią – w fazie 4 – 8 liści, wiosną – dwa zabiegi od początku wydłużania pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych, w odstępie 10 – 14 dni
Buraki cukrowe	2	2 zabiegi: od fazy 6 liści do zwarcia międzyrzędzi
Ziemniak	2	2 zabiegi: pierwszy – na początku intensywnego wzrostu liści i łodyg, następny – na początku kwitnienia
Drzewa owocowe	1 – 2	2 – 4 zabiegi: wiosną – 1 – 2 zabiegi od pęknięcia pąków do początku kwitnienia, jesienią – 1 – 2 zabiegi po zbiorach, przed opadaniem liści (zalecana dawka 2 l/ha)
Truskawki	2	2 zabiegi: pierwszy – po ruszeniu wegetacji, drugi – jesienią, 10 – 14 dni po zbiorach lub skoszeniu liści
Warzywa kapustne	2	2 zabiegi: pierwszy - w fazie 4 – 6 liści, następny po 10 – 14 dniach
Warzywa korzeniowe	2	2 zabiegi: pierwszy – w fazie 3 – 4 liści, następny po 10 – 14 dniach
Warzywa strączkowe	2	1 zabieg: krótko przed początkiem kwitnienia
Pomidory, papryka	2	1 zabieg: krótko przed początkiem kwitnienia
Słoneczniki	2	2 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści do początku wzrostu pędu głównego

