

VitaFer[®]

N+

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania azotu i magnezu

36,18% N + 4,02% MgO
+ 0,13% SO₃ + mikroelementy

VitaFer[®] N+ jest wysoko skoncentrowanym nawozem do zapobiegawczego i interwencyjnego (widoczne objawy niedoboru) dostarczania azotu oraz magnezu roślinie. Nawóz dodatkowo wzbogacony jest o pełną paletę mikroelementów i wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieczy roboczej.

VitaFer[®] N+ szczególnie polecany jest dla upraw ozimych (zboża, rzepak), ponieważ przygotowuje je do przejścia w stan spoczynku zimowego oraz podnosi ich odporność na warunki stresowe, takie jak np. mróz.

Zalecany jest także dla młodych upraw, które nie mają jeszcze dostatecznie rozwiniętego systemu korzeniowego i narażone są na warunki stresowe. Podnosi ich odporność i zapewnia prawidłowy rozwój, co przekłada się na wzrost wartości handlowej plonów.

Charakterystyka działania

- Nawóz jeszcze intensywniej zaopatruje rośliny w azot i inne niezbędne do prawidłowego rozwoju składniki,
- Dodatek magnezu, który jest bardzo ważny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych roślin, poprawia wzrost ich masy zielonej,
- Szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych,
- Poprawia gospodarkę wodną w roślinach, co podnosi ich tolerancję na suszę i inne stresy fizjologiczne,
- Chroni rośliny przed wieloma chorobami związanymi z niedoborem magnezu i azotu, a zastosowany w momencie objawienia się deficytu, wspiera procesy regeneracyjne roślin,
- Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników odżywczych z gleby.

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Liczba zabiegów	Dawka (l/ha)	Terminy zabiegów
Buraki cukrowe	3	5	Faza 3-4 liści (BBCH 13-14) i dwa zabiegi w dwutygodniowym odstępie czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39)
Drzewa i krzewy owocowe	2	5	Faza rozwoju liści (BBCH 15-19) oraz w okresie intensywnego wzrostu
Kukurydza	1-2	5	Faza 6-8 liści (BBCH 16-18) i dwa tygodnie po pierwszym zabiegu
Rzepak	3	5	Jeden zabieg jesienią: w fazie 4 - 8 liści (BBCH 14-18), dwa zabiegi wiosną: po wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 50-59)
Strączkowe	2	5	W okresie intensywnego wzrostu (BBCH 13-70)
Warzywa gruntowe	2-3	5	Od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, w odstępach 8 - 10 dni
Zboża	3-4	5	Jeden zabieg jesienią: od fazy 3. liścia (BBCH 13); 2-3 zabiegi wiosną: po ruszeniu wegetacji do końca fazy kłoszenia, w odstępach 10-14 dni
Ziemniaki	3	5	2 - 3 tygodnie po początku kielkowania, w odstępach 10 - 14 dni

