



Zaleca się stosowanie VitaFer Green 2-3 l/ha oraz VitaFer Algi 2-3 l/ha w krytycznych sytuacjach (po wystąpieniu warunków stresowych, np. przymrozki, susza, opady gradu, nadmierna wilgotność gleby, itd.) w celu ratowania upraw (w każdej fazie rozwoju winogron).



Początek wegetacji,
rozwój liści



Rozwinięte
cztery do pięciu liści

Kwitnienie



Wzrost zawiązków



Początek twardnienia
i dojrzewanie jagód

Po zbiorach

Nr zabiegu	Faza rozwoju	Produkt	Liczba zabiegów	Dawka l/ha
1	Początek wegetacji, rozwój liści	VitaFer Macro P	1	1,5
		VitaFer Micro	1	1-2
		VitaFer Kombi	1	3,5
2	Rozwinięte 4-5 liści, kwitnienie	VitaFer Boron	1	2
3	Wzrost zawiązków	VitaFer Micro	1	1
		VitaFer EXTRA Ca	1	3-5
		VitaFer Macro K*	1	3-5
4	Początek twardnienia i dojrzewanie jagód	VitaFer Micro	1	1
		VitaFer Ca	1	0,5-1,5
5	Po zbiorach	VitaFer Boron	1	2-3

Zaleca się stosowanie VitaFer Green 2-3 l/ha oraz VitaFer Algi 2-3 l/ha w krytycznych sytuacjach (po wystąpieniu warunków stresowych, np. przymrozki, susza, opady gradu, nadmierna wilgotność gleby, itd.) w celu ratowania upraw (w każdej fazie rozwoju winogron).

*VitaFer Macro K można stosować także w fazie twardnienia i dojrzewania jagód.